



Australian Shepherd Health & Genetics Institute, Inc



1338 Trouville Ave,
Grover Beach,
CA 93433

Tel: 805-473-0093
www.ashgi.org



Hernie Ombilicale

Les hernies ombilicales sont des morceaux de tissu qui dépassent à travers l'ouverture ombilicale. Certaines hernies chez les jeunes chiots disparaissent d'eux-mêmes en quelques semaines ou mois, mais si elles sont encore présentes à l'âge de 5-6 mois, ce n'est pas susceptible de changer sans chirurgie. Parfois, l'ouverture dans la paroi abdominale est très petite, de sorte que ce que vous voyez n'est seulement qu'un peu de gras de l'intérieur de l'abdomen. La paroi peut effectivement avoir fermée, isolant un petit morceau de gras sous la peau. Les grandes ouvertures constituent un danger pour le chien en raison du risque qu'une boucle d'intestin sort et s'étrangle. Cela nécessite une correction chirurgicale et ces chiens ne doivent pas reproduire.

Il y a un mythe persistant que les hernies sont causées par la mère qui tire sur le cordon ombilicale à la naissance. Ceci n'est pas vrai. Les hernies ombilicales sont héritées et doivent être considérés comme défectueuse. Les chiens avec des hernies mineures peuvent être mis en reproduction, mais pas avec des chiens qui ont des hernies ombilicales ni avec des apparentés proches qui les ont. Les mâles avec des hernies ne doivent pas être utilisés beaucoup.

Les hernies dans d'autres endroit que l'ombilic ne sont pas connus pour être héritée.

Traduit par Corine Graham

t